МОГИЛЕВСКИХЪ
ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
КЪ № 27-му.
ЗА 1850 ГОДЪ

О признакахъ лѣтъ лошади.

(Окончаніе).

Зубы у лошадей стираются или съѣдаются отъ жеванья, но они отъ того не уничтожаются, потому что продолжаютъ рости въ концахъ корней во все время жизни лошади; на сколько зубы съѣдаются, на столько и выростаютъ у корней: наружная ихъ часть не уменьшается. Въ старости она кажется длиннѣе, но это отъ того, что десны, лишаясь съ лѣтами полноты, сжимаются, и зубы оскаливаются. Увѣряютъ, что у кровныхъ лошадей зубы съѣдаются и отростаютъ ежегодно на одну линію, а у простыхъ на полторы линіи. Вотъ отчего возможно замѣчать перемѣны въ зубахъ и опредѣлять по нимъ лѣта животнаго.

Въ зубахъ лошади измѣняются: 1-е *видъ верхушки* съ боковъ и съ обѣихъ сторонъ, передней и задней, 2-е *края*, 3-е *видъ и величина чашки*, и 4-е *сердцевина*.

Сначала, какъ скоро выйдетъ новый зубъ, окружность *верхушки* представляетъ узкой вытянутый овалъ, который, въ послѣдствіи, дѣлается круглѣе и шире, потомъ почти полукруглымъ, и наконецъ становится треугольнымъ. Края новаго матераго зуба остры. Они составляются изъ наружной глазури зуба и изъ глазури чашки. Передній край зуба выше задняго, передній выходитъ первый и онъ же раньше стирается. Какъ скоро зубъ начинаетъ съѣдаться, то и края его, составляющіеся изъ двухъ глазурей, именно изъ наружной зубной и чашечной въ серединѣ, въ тоже время расходятся и такъ, что между ними обнаруживается зубная желтая кость. Задній край сначала тоже остеръ; онъ ниже передняго, выходитъ позднѣе изъ десны и позднѣе стирается. Поровнявшись, въ послѣдствіи, съ переднимъ стершимся краемъ, начинаетъ и онъ стираться; и въ немъ обѣ глазури, крайняя и средняя, расходятся, а съ тѣмъ вмѣстѣ показывается между ними желтая кость. Какъ скоро оба края, передній и задній, вер-

хушки зубной сравняются, то они уже не могутъ быть показателями лѣтъ.

Вмѣстѣ съ измѣненіемъ верхушки зубной перемѣняются видъ и величина чашки. Надобно замѣтить, что чашка, пока не стерлась, бываетъ одинакой фигуры съ верхушкою зуба. Когда же оба края наружной и внутренней стороны зуба сотрутся, тогда чашка съуживается, уменьшается, становится продолговатой ямникой, обложенной глазурью, глазурь въ то время нѣсколько выдается изъ средины зуба; это примѣтно для глаза и ощутительно на ощупь. Въ послѣдствіи ямника чашки совсѣмъ стирается и остается, вмѣсто нея, черноватый рубчикъ изъ глазури. Тогда обыкновенно говорятъ: *зубъ съѣденъ*. Утверждаютъ, что тогда по зубамъ уже нельзя узнать лѣтъ лошади. Это несправедливо, потому что слѣдъ чашки, именно: черный глазурный рубчикъ, еще остается на нѣкоторое время въ зубу и можетъ, по своимъ перемѣнамъ, служить показателемъ лѣтъ. Этотъ глазурный рубчикъ, остатокъ чашки, бываетъ похожъ на ячменное зерно, которымъ и называется. Зерно, спустя годъ послѣ своего появленія, дѣлается короче и уже, однакожъ лежитъ на серединѣ верхушки зуба. Потомъ постепенно уменьшается, подходитъ ближе и ближе къ заднему краю зуба и наконецъ вовсе пропадаетъ. Какъ скоро зерно начнетъ отходить отъ середины верхушки и приближаться къ заднему краю зуба, въ то время между зерномъ и переднимъ краемъ, въ серединѣ желтой кости, появляется сердцевина въ видѣ бѣлесоватой узенькой полоски. Сердцевина часъ отъ часу выказывается больше и больше и, наконецъ, когда зерно пропадетъ, остается въ верхушкѣ зубной въ видѣ пятна, отмѣннаго отъ прочей желтой кости. Замѣтить должно, что около этого пятна нѣтъ глазурнаго ободочка, изъ котораго обыкновенно состоитъ зубное зерно. Иногда внутри сердцевиннаго пятна показывается скважина, въ которую можетъ пройти щетина или двѣ. Это бываетъ у самыхъ старыхъ лошадей, у которыхъ зубная пустота въ концѣ не совсѣмъ заросла. Зубы выходятъ изъ десенъ не вдругъ, но одинъ за другимъ, по этому всѣ упомянутыя перемѣны, въ каждомъ изъ нихъ, дѣлаются не въ одно время.

Не только зубы, но и челюсти измѣняются съ лѣтами лошади. У новорожденнаго жеребенка, челюсти бываютъ очень узки; съ появленіемъ новыхъ зубовъ, челюсти постепенно выростаютъ и дѣлаются шире и круглѣе. Когда лошадь достигнетъ шести лѣтъ, то есть совершеннаго возраста, челюсть доходитъ до своей настоящей величины и спереди представляетъ полукругъ: потомъ зубы въ челюсти начинаютъ вытягиваться, а съ ними самая челюсть съуживается; тогда зубы растутъ впередъ, голова становится клиномъ. Съ одного взгляду, не глядя въ зубы, можно узнать старую лошадь, у которой и ямки надъ глазами дѣлаются глубокими.

И такъ есть несомнѣнныя примѣты, по которымъ можно безошибочно узнать лѣта лошади. Возрастъ лошади раздѣляютъ на три времени, а именно: на возрастъ *жеребенка*, начиная отъ рожденія до первой смѣны переднихъ молочныхъ зубовъ матерыми; возрастъ *молодости*, отъ окончанія смѣны молочныхъ зубовъ до выхода послѣдняго кореннаго зуба; время *совершеннолѣтія* и *старости* простирается до 25 и 28 лѣтъ жизни.

Вотъ примѣты по зубамъ возраста жеребенка. Жеребенокъ родится съ первымъ и вторымъ молочными коренными зубами; иногда они вырѣзываются между первымъ и четвертымъ днемъ.

У шести и четырнадцати дневнаго жеребенка, вырѣзываются молочные зубы, тогда всѣхъ зубовъ у него двѣнадцать.

У двадцати четырехъ и тридцати дневнаго выходитъ третій коренный молочный зубъ; всѣхъ зубовъ у него шестнадцать, а именно: по три молочныхъ коренныхъ въ верхней и въ нижней челюсти съ

обѣихъ сторонъ, и по два рѣзца переднихъ въ обѣихъ челюстяхъ.

У четырехъ мѣсячнаго жеребенка выходятъ середніе молочные зубы. Тогда всѣхъ зубовъ у него двадцать.

У шести и семи мѣсячнаго, рѣзцы съ обоихъ краевъ стерлись, въ среднихъ зубахъ задніе края сравнялись съ передними.

У десяти мѣсячнаго показываются молочные украйки, которые пониже прочихъ. Тогда всѣхъ зубовъ у него двадцать четыре.

У двѣнадцати мѣсячнаго жеребенка вырѣзывается четвертый коренной зубъ. Годовый жеребенокъ имѣетъ всѣхъ зубовъ двадцать восемь, именно: двадцать четыре молочныхъ и четыре постоянныхъ или матерыхъ. Украйки у него еще ни сколько нестерлись, они только выросли въ ровень съ прочими передними зубами, которые, впрочемъ, довольно уже стерлись.

У двадцати мѣсячнаго показывается пятый зубъ, коренной матерой. Всѣхъ зубовъ у него тридцать два.

У двухъ лѣтняго жеребенка рѣзцы и середніе молочные зубы совсѣмъ сведены; въ украйкахъ же задній край почти сравнялся съ переднимъ.

У жеребенка двухъ лѣтъ, первые и вторые молочные зубы коренные выпадаютъ и замѣняются матерыми, и такъ у него шестнадцать молочныхъ и шестнадцать матерыхъ, а всего тридцать два зуба.

У молодой лошади, трехлѣтней, молочные рѣзцы замѣнились матерыми рѣзцами, которые еще не тронуты; середніе молочные очень стерты и украйки тоже. Молочныхъ зубовъ у трехлѣтка двѣнадцать, матерыхъ двадцать, всего тридцать два зуба.

У четырехъ-лѣтней лошади смѣнились середніе молочные и еще третьи коренные, такъ же показались колы; передній край матерыхъ рѣзцовъ стертъ, а задній нетропутъ; новые середніе зубы совершенно цѣлы, а молочные украйки уже совсѣмъ съѣдены.

Въ концѣ пятаго году у лошади вышли новые матерые украйки. Они нѣсколько меньше среднихъ зубовъ; передній край у нихъ гораздо выше задняго; средніе зубы поровнялись съ рѣзцами; ихъ задніе края поровнялись съ передними, которые уже съѣдены.

Въ пять лѣтъ оба края рѣзцовъ съѣдены, чашки тронуты, съузились, но еще видны, колы вышли совершенно. Тогда лошадь имѣетъ тридцать шесть матерыхъ зубовъ, которые сидятъ правильно полукругомъ.

Въ совершенномъ возрастѣ у шести лѣтней лошади украйки сравнялись величиною съ середними; ихъ передніе края съѣдены, а задніе цѣлы. Въ середнихъ оба края съѣдены, чашки въ нихъ заровнялись, но еще видны; рѣзцы совершенно съѣдены, образовались на мѣсто чашекъ зерна, по срединѣ въ нихъ маленькія ямочки. Наконецъ вырѣзался и послѣдній коренной зубъ. Шести-лѣтняя лошадь имѣетъ полное число чубовъ, а именно сорокъ.

Середніе зубы у семи-лѣтней лошади и чашки съѣдены, образовались зерны сдѣлались почти треугольныя; въ украйкахъ задніе края сравнялись съ передними краями, и старые стерлись. Также и чашки тронуты.

Въ восемь лѣтъ у лошади чашки во всѣхъ зубахъ нижней челюсти съѣдены: рѣзцы получили кругловатую форму; зерно въ рѣзцахъ съузилось и отошло ближе къ заднему краю; между зерномъ и переднимъ краемъ показался бѣлесоватый рубчикъ сердцевины. Средніе зубы начали округляться, зерно треугольное; въ украйкахъ зерно имѣетъ еще маленькую ямочку.

Въ девять лѣтъ рѣзцы начинаютъ округляться, зерно ихъ еще болѣе подходитъ къ заднему краю, украйки округляются и зерно въ нихъ треугольно. Во всѣхъ зубахъ видна сердцевина, а въ рѣзцахъ больше прочихъ.

Въ десять лѣтъ рѣзцы округлены, зерно въ нихъ очень близко къ заднему краю;

середніе зубы начали скруглятся; зерно ихъ тоже круглое и очень близко подошло къ заднему краю; украйки еще овальны, зерно ихъ кругло и подошло къ заднему краю.

Въ одинадцать лѣтъ украйки скругляются; сердцевина, въ видѣ пятна, занимаетъ середину верхушки въ рѣзцахъ и серединхъ; зерна чуть видны во всѣхъ зубахъ возлѣ задняго краю.

Въ двѣнадцать лѣтъ всѣ зубы скруглились; въ рѣзцахъ нижнихъ зерно совсѣмъ пропало, въ серединхъ и украйкахъ чуть видно у задняго краю. Сердцевинное пятно въ рѣзцахъ круглое; а въ другихъ зубахъ продолговато. Въ верхнихъ зубахъ зерна еще довольно видны у заднихъ краевъ.

Въ тринадцать лѣтъ всѣ нижніе зубы сдѣлались кругловатыми; рѣзцы съ боковъ какъ будто поприжились и начали дѣлаться треугольными. Сердцевина въ середнихъ и украйкахъ скруглилась и стала въ середине верхушки. Въ верхнихъ зубахъ зерна круглы и близко подходятъ къ заднимъ краямъ, колы много обтерты.

Въ четырнадцать лѣтъ нижніе рѣзцы почти треугольны; середніе начали дѣлаться треугольными; украйки скруглены; колы очень тупы. Въ верхнихъ зубахъ зерна очень не велики, но еще довольно примѣтны, возлѣ самыхъ заднихъ краевъ.

Въ пятнадцать лѣтъ рѣзцы совсѣмъ треугольны; середніе почти сдѣлались треугольными; украйки еще круглы, сердцевина во всѣхъ зубахъ имѣетъ видъ кругловатаго не большаго пятнышка. Зерно, въ верхнихъ зубахъ, еще не пропало, особенно въ серединхъ и украйкахъ.

Въ шестнадцать лѣтъ рѣзцы и середніе треугольны, украйки начинаютъ дѣлаться треугольными; колы чрезвычайно тупы; зерна въ верхнихъ зубахъ совсѣмъ пропали.

Въ семнадцать лѣтъ въ нижней челюсти рѣзцы и середніе зубы начинаютъ расходиться и сжиматься краями.

Въ восьмнадцать лѣтъ зубы очень разошлись и всѣ треугольны, смыкаются краями; бока въ каждомъ изъ нихъ равно длинны.

Въ девятнадцать лѣтъ рѣзцы представляютъ нѣсколько сжатый съ боковъ и продолговатый сзади треугольникъ; середніе и украйки имѣютъ видъ равносторонняго треугольника.

Въ двадцать лѣтъ рѣзцы много сжаты; середніе начали сжиматься; украйки еще треугольны.

Въ двадцать одинъ годъ рѣзцы и середніе сжаты; украйки тоже начали съуживаться съ боковъ, а лошадь двадцати двухъ лѣтъ должна имѣть всѣ зубы сжатые и выгнутые. Послѣ того начинается глубокая старость. Съ этаго времени зубы не представляютъ особыхъ отличій, по которымъ можно было бы судить о лѣтахъ лошади. Зубы больше и больше съуживаются, опять сдвигаются вмѣстѣ; выдаются изъ десенъ, которыя дѣлаются блѣдными; челюсти съуживаются; верхушки зубовъ становятся сѣры; зубы снаружи желтѣютъ, при деснахъ покрываются густою накипью, и все тѣло показываетъ глубокую старостьи.

Зубы у иныхъ лошадей не правильно и не въ одно время выростаютъ и стираются, особливо у той, которая имѣетъ, такъ называемый *смоленой* твердый, желтый зубъ, который долго остается единообразнымъ, мало съѣдается и не можетъ означать лѣтъ лошади. Многіе конские барышники поддѣлываютъ зубы, держась тѣхъ указаній, которые здѣсь изложены: лошадь старая съ поддѣланными зубами кажется молодою.

(Изъ Жур. Кон. и Охот.

О разведеніи крапивы на выдѣлку волокна.

Крапива вообще извѣстна двухъ сортовъ: 1) *Крапива большая* (Urtica dioica), раздѣляющаяся на поскопь и сѣмянную крапиву, точно какъ конопля и 2) *лѣсная*,

болотная или луговая крапива (Urtica Sylvestris.) Та и другая крапива разводится отъ сѣмянъ и отъ корневыхъ черенковъ. Это дѣлается, смотря по климату мѣста, въ Сентябрѣ или Октября. Крапива изъ сѣмянъ только на второй годъ послѣ посѣва бываетъ способна для полученія волокна, почему въ первое лѣто, ее косятъ или жнутъ на кормъ скоту. Разведенная отъ корневыхъ черенковъ хорошо ростетъ, и на первомъ году можно ее обработывать на пряжу.

Крапива удачно произрастаетъ на всякой почти почвѣ и, будучи разъ посѣяна, или посажена на воздѣланной землѣ, прозябаетъ нѣсколько лѣтъ безъ обработыванія, только нужно осенью, если земля тоща, набросать на нее перегнившаго навоза, или тучной огородной земли, толщиною въ полвершка.

Крапиву не выдергиваютъ съ корнемъ, какъ конопли, но жнутъ близъ корней серпомъ, или косятъ, когда она поспѣетъ подобно конопли. Оставляютъ ее на полѣ, пока высохнетъ, связываютъ въ пучки и мочатъ, преимущественно въ стоячей или весьма медленно текущей водѣ, напр. въ озерѣ, или въ прудѣ. При этомъ надобно стараться, чтобы грунтъ пруда былъ глинистый или твердый.

Крапива поспѣваетъ въ мочень и гораздо скорѣе, чѣмъ конопля, почему должно соблюдать, чтобы не перемокла. Остальная обработка, чтобъ получить волокно, совершенно подобна обработкѣ конопли, т. е. ее мнутъ на мялицахъ, треплютъ и толкутъ и получается весьма хорошее волокно.

А. Д.

(Тр. Им. В. Э. Об.)

ОБВАРНЫЕ ОГУРЦЫ.

Вотъ средство сберегать впрокъ огурцы на долгое время и отличнаго качества, что извѣстно намъ по опытамъ, а не по наслышкѣ.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ растетъ вишневое дерево, приготовляютъ сѣчку изъ вишневаго листа по-поламъ съ укропомъ и настилаютъ ею тонкій рядъ на дно сосуда, избраннаго для соленія; на этотъ рядъ кладутъ рядъ огурцовъ и т. д., наполняя до верха (*). Между тѣмъ, пока укладка огурцовъ будетъ готова, составляютъ взваръ изъ одного фунта поваренной, а гдѣ нѣтъ ея—тамъ озерной соли, двухъ фунтовъ того же листа, одного золотника гвоздики и двухъ золотниковъ корицы, принимая эту пропорцію за мѣру на всякую сотню огурцовъ. Послѣ того, горячій еще взваръ выливаютъ прямо на огурцы, безъ всякихъ предварительныхъ приготовленій или остуживанія, если онъ, какъ говорятъ, «вскипѣлъ ключемъ,» и давъ имъ слегка остынуть, закупориваютъ на-крѣпко и заливаютъ укупорку смолою или сургучемъ. Мѣстомъ для храненія избираютъ колодезь или глубину земли—и, въ обоихъ случаяхъ, огурцы бываютъ равно хороши.

Намъ самимъ этотъ способъ приготовленія впрокъ огурцовъ вначалѣ казался страннымъ и даже невозможнымъ въ исполненіи по нѣкоторымъ причинамъ; но одинъ—два опыта склонили насъ въ его пользу. Совѣтуемъ испытать и потомъ уже составить заключеніе о самомъ средствѣ. Многіе кладутъ во взваръ какую-то «красную траву»—и весьма хвалятъ, но это намъ неизвѣстно; другіе приготовляютъ нѣсколько небольшихъ плотныхъ боченковъ и, наполнивъ ихъ огурцами по описанному способу, зарываютъ въ землю и расходуютъ потомъ одинъ за другимъ въ продолженіе зимы. Польза этого очевидна: однажды раскупоренный боченокъ большаго размѣра требуетъ непродолжительнаго израсходованія, потому что огурцы, приведенные въ соприкосновеніе съ свободнымъ воздухомъ, скоро подвергаются порчѣ, т. е. раз-

---

(*) Мы слышали, что недостатокъ вишневаго листа замѣняютъ съ успѣхомъ листьями дуба. Совѣтуемъ и это испытать.

ложенію. Не совѣтуютъ подливать во взваръ ни одной капли холодной или невскипяченой воды: иначе, скоропостижная порча огурцовъ неизбѣжна. Неберемся сравнивать описаннаго способа приготовленія огурцовъ для зимняго употребленія съ извѣстнымъ способомъ приготовленія ихъ съ чеснокомъ;—пусть знатоки, имѣющіе теперь наше наставленіе передъ собою, испытаютъ его—и, мы увѣрены, скажутъ намъ—доброе спасибо.

А. А.

Село Покойное на Кавказѣ.

КАКЪ ИЗЪ РУССКАГО ТОПЛЕНАГО МАСЛА СДѢЛАТЬ ЧУХОНСКОЕ.

Я передаю секретъ неоцѣненный, пріобрѣтенный мною дорого и оправданный нѣсколькими опытами. Можетъ быть, иному покажется страннымъ и не вѣроятнымъ —наше русское топленое масло обращать въ свѣжее чухонское. Но никто не станетъ спорить, что русскаго масла не подашь на завтракъ, да и во многихъ случаяхъ имъ не замѣнишь чухонскаго, а это послѣднее, напротивъ, во всѣхъ безъ исключенія потребностяхъ кухни и стола превосходно замѣняетъ русское масло. Кромѣ того чухонское масло не во всякое время года можно имѣть свѣжимъ и за дешевую цѣну, тогда какъ топленое масло иногда продается не по чемъ и всюду находится. Я увѣренъ, что предлагаемый мною способъ найдетъ многихъ послѣдователей.

Надобно слегка растопить русское топленое масло, остерегаясь всячески, что бы оно не пригорѣло. Потомъ вылить его въ холодную воду, и когда оно остынетъ, вынуть его изъ воды, собрать, завернуть въ чистую салфетку и опять положить на одинъ или на два часа въ холодную воду. Наконецъ, вынувши изъ воды, отнести его на холодъ (въ сѣни или на крыльцо) и бить скалкою на доскѣ осыпанной льдомъ или снѣгомъ,—бить, не жалѣя силъ и до пота лица. Вскорѣ топленое масло, при содѣйствіи мороза, измѣняетъ свою натуру и принимаетъ не только видъ, но вкусъ настоящаго только лишь сбитаго чухонскаго масла: вы можете смѣло намазывать имъ хлѣбъ и вѣрно будете кушать съ апнетитомъ. Только не забудьте, что операція битья скалкою должна совершаться на льду или на снѣгу, во время порядочнаго мороза, и что топленое масло надобно брать свѣжее, не соленое и не прогорьклое.

(Журн. Общеполез. Свѣд.).

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.

Въ пользу пострадавшихъ отъ пожара жителей г. Орла разными Духовными лицами Пропойскаго и Шкловскаго благочиній пожертвовано 6 р. 80 к. серебромъ.

Въ Губернскомъ городѣ Могилевѣ съ 1-го по 8-е Іюля 1850 года существуютъ слѣдующія цѣны на съѣстные припасы.

	Серебромъ. Руб.	коп.
МУКИ РЖАНОЙ:		
Куль 9-ти пудоваго вѣсу . .	4	50
Четверть 8-ми четв. мѣры въ 7 пудъ 10 фунт. вѣсу . . .	3	62½
КРУПЪ:		
Гречневыхъ четверть	3	85.
Ячныхъ	3	75
Овсяныхъ	9	50.
Пшеновыхъ пудъ	—	70.
Гороху бѣлаго	—	70.
Солоду ржаваго	1	45.
Овса четверть	2	10.
Сѣна пудъ	—	15
МУКИ ПШЕНИЧНОЙ:		
Крупичистой 1-го сорта	1	60
Простой	1	—
Соли бѣлой пудъ	—	75
МАСЛА ПУДЪ:		
Коровьяго	7	50
Конопляннаго	3	20
Деревяннаго	10	—
ГОВЯДИНЫ СВѢЖЕЙ:		
1-го сорта пудъ . . .	1	80.
2-го	1	60.
3-го	1	20.
Сала полтеваго	3	75.
Меду патоки чистой	6	80
Рыбы вялыхъ судаковъ пудъ. .	2	—
Луку рѣпчатаго	—	65
Уксуса обыкновеннаго	—	60

Съ 29-го Іюня по 6-е Іюля 1850 года въ городъ Могилевъ.—

ПРІѢХАЛИ:

Быховск. уѣзда помѣщ. Стаховскій.
Рогачевск. уѣзда помѣщ. Гоеръ.
Изъ м. Бялын. отст. поруч. Гуцевичъ.
Могилевск. уѣзда пом. Маіоръ Борко.
Маіоръ Кошанскій.
Изъ Смоленск. Кол. Ассес. Свидзинскій.
Диснепс. Земс. Исиравн. Черневскій.
Штабъ-ротмистръ гусарск. Генер.-Фельдм. Князя Варш. Граф. Эрив. пол. Поярковъ.
Быховск. уѣзда помѣщ. Щанявскій.
Изъ Быхова отст. маіоръ Кончицъ.
Климовицк. уѣзда помѣщ. Волловичъ.
Изъ Черик. титул. совѣт. Жижемскій.
Могилевск. уѣзда помѣщ. Пентковскій.
Флигель Адъютантъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полковн. Князь Варшавскій Графъ Паскевичъ-Эриванскій.
Состоящій при Главнокоман. Дѣйствующ. Арм. Генералъ-Маіоръ Бутурлинъ.
Изъ Орла учитель кол. ассес. Тарачковъ.
Рогачевск. уѣзда помѣщ. Діемуншъ.
Приставъ 1. ст. Могил. уѣзда Стаховскій.
Изъ С. Петерб. чиковн. Кіевск. Военн. Губернатора губерн. секр. Меллинъ.
Мстиславск. уѣзда помѣщ. Сердюковъ.
Изъ Климов. губерн. секр. Михневичъ.

ВЫѢХАЛИ.

Совѣтникъ Могилевск. Губерн. Правленія Дейнеко.
Копыск. уѣзда помѣщ. Мирецкій.
Оршанск. уѣзда помѣщ. Ростковскій.
Губерн. Секр. Бруевичъ.
Сѣнинск. уѣзда помѣщ. Хорощо.
Тогожъ уѣзда помѣщ. Дроздовскій.
Мстиславск. окруж. началь. Баумгартенъ.
Копыск. уѣзда помѣщ. Заржецкій.
Лепельск. уѣзда помѣщ. Чеховичъ.
Учитель Рогач. уѣзд. училищ. Коллежск. Ассес. Гречко.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВѢ.

Съ 30-го Іюня по 7-е Іюля 1850 года.

Числа.	ДНИ.	Періоды дня	Высота термометра.	Состояніе атмосферы.	ВѢТРЫ.
Іюнь 30	Пятница.	Утро.	+ 11°.	ясно.	ЮВ. умѣренный.
		Полдень.	+ 22°.	—	—
		Вечеръ.	+ 15°.	—	—
Іюль 1	Суббота.	Утро.	+ 10°.	ясно.	ЮВ умѣренный.
		Полдень.	+ 22°.	—	—
		Вечеръ.	+ 13°.	—	—
2	Воскресенье.	Утро.	+ 10°.	дождь.	СВ. умѣренный
		Полдень.	+ 13°.	—	—
		Вечеръ.	+ 11°.	—	—
3	Понедѣльникъ.	Утро.	+ 10°.	облачно.	В. слабый.
		Полдень.	+ 18°.	—	—
		Вечеръ.	+ 10°.	дождь.	— умѣренный.
4	Вторникъ.	Утро.	+ 10°.	облачно.	В. умѣренный
		Полдень.	+ 18°.	—	—
		Вечеръ.	+ 11°.	дождь.	—
5	Среда.	Утро.	+ 11°.	дождь.	В. умѣренный.
		Полдень.	+ 18°.	—	—
		Вечеръ.	+ 12°.	—	—
6	Четвергъ.	Утро.	+ 11°.	дождь.	ЮЗ. умѣренный.
		Полдень.	+ 18°.	—	—
		Вечеръ.	+ 12°.	облачно.	—

Печатать позволяется: Исправляющій должность Гражданскаго Губернатора Вице-Губернаторъ *Баборыкинъ.*

6-го Іюня 1850 года.